




**CÔNG TY CỔ PHẦN  
HÀ TÂN KỲ**



# **CẨM NANG CHĂN NUÔI**

## **QUY TRÌNH CHĂN NUÔI ĐÀ ĐIỀU**



 [Traigiongdadieu.com.vn](http://Traigiongdadieu.com.vn)

 312/2 Bình Cang, Bình Quới,  
Châu Thành, Long An

 096.177.6664

 [Companyhatanky@gmail.com](mailto:Companyhatanky@gmail.com)

## Lời Mở Đầu

1

Chăn nuôi là một trong hai ngành sản xuất chủ yếu của nông nghiệp, với đối tượng sản xuất là các loại động vật nuôi nhằm cung cấp các sản phẩm đáp ứng nhu cầu của con người. Ngành chăn nuôi cung cấp các sản phẩm có giá trị kinh tế cao như thịt, trứng, sữa, mật ong... nhằm đáp ứng các nhu cầu tiêu dùng thiết yếu hàng ngày của người dân. Một xu hướng tiêu dùng có tính qui luật chung là khi xã hội phát triển thì nhu cầu tiêu dùng về các sản phẩm chăn nuôi ngày càng tăng lên một cách tuyệt đối so với các sản phẩm nông nghiệp nói chung. Chăn nuôi là ngành cung cấp nhiều sản phẩm làm nguyên liệu quý giá cho các ngành công nghiệp chế biến thực phẩm và dược liệu. Chăn nuôi là ngành ngày càng có vai trò quan trọng trong việc cung cấp các sản phẩm đặc sản tươi sống và sản phẩm chế biến có giá trị cho xuất khẩu.

Nhằm hướng tới và giới thiệu cho quý Cô chú/Anh chị - giống vật nuôi mới, ĐÀ ĐIỀU. Đây là giống vật nuôi đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho phép sản xuất và kinh doanh tại Việt Nam theo thông tư số 01/2018/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 01 năm 2018.

Mô hình chăn nuôi Đà điều mang lại lợi nhuận kinh tế cao, chi phí thức ăn và nhân công thấp. Đây là mô hình chăn nuôi điển hình trong bối cảnh dịch bệnh, chi phí thức ăn tăng cao như hiện nay. Vấn đề nằm ở chỗ, Anh/chú không biết kỹ thuật chăn nuôi ra sao?

Nắm bắt được tình hình trên, Công ty CP Hà Tân Kỳ, trực thuộc tại huyện châu Thành tỉnh Long An, với hơn 10 năm kinh nghiệm trong việc chăn nuôi và chăm sóc đà điều. Với quy mô hàng trăm con đà điều sinh sản, hàng năm xuất ra thị trường hơn 3000 con giống- Tự hào là trang trại chăn nuôi đà điều lớn nhất khu vực Đông và Tây Nam bộ. Trang trại xây dựng và phát triển Trung Tâm Tư Vấn Kỹ Thuật Hà Tân Kỳ - giới thiệu và chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc đà điều thông qua **CẨM NANG CHĂN NUÔI ĐÀ ĐIỀU (GIAI ĐOẠN TỪ 90 NGÀY – 1 NĂM TUỔI)** nhằm mục đích giúp cho quý Cô chú/Anh chị nắm bắt được kỹ thuật chăn nuôi, đáp ứng với thực tiễn hiện nay.

Với phương châm **“ĐỒNG HÀNH KHAI PHÁ THỊNH VƯỢNG”** ra đời làm điều kiện tiên quyết của công ty Hà Tân Kỳ chúng tôi - với mong muốn góp phần sức trong công cuộc hòa nhập và phát triển ngành chăn nuôi trong thời buổi kinh tế hiện nay. Tất cả cùng nhau hướng tới mục tiêu đưa ngành chăn nuôi Việt Nam vươn tầm phát triển bền vững và hiệu quả


*Trân trọng!*



## Kỹ thuật chăn nuôi đà điểu giai đoạn từ 90 ngày – 1 năm tuổi

### I. Chuồng nuôi :

- Chuồng trại đơn giản, chỉ cần đủ không gian để đà điểu chạy nhảy, giúp thịt săn chắc, tăng chất lượng. Với 100 con đà điểu được chia thành 3 chuồng, mỗi chuồng có kích thước (30 x 30) m, nền chuồng được rải cát hoặc làm nền đất thịt bằng phẳng để tránh trơn trượt



- Chuồng nuôi có thể rào bằng lưới B40, lưới B40 phải được loại bỏ hết các đầu sắc bén để tránh việc chấn thương cho đà điểu trong lúc chạy. Chuồng phải có mái che để đà điểu trú mưa.

**Chú ý:** Chuồng nuôi cần phải được kiểm tra và loại bỏ hết các dị vật như: túi ni long, dây, đá to, lá cây....



Hình 1: Chuồng nuôi đà điểu

## II. Thức ăn và cách thức cho ăn

### 2.1. Thức ăn

- Thức ăn cho đà điểu gồm:

- Thức ăn xanh (rau muống, rau lang, bắp cải già, cỏ ghi nê, cỏ voi.....), phải được băm nhỏ để đà điểu dễ tiêu hóa.
- Thức ăn tinh : Sử dụng các loại thức ăn của gà, vịt.

- Thức ăn xanh đảm bảo nguồn gốc rõ ràng không phun thuốc trừ sâu để tránh cho đà điểu bị ngộ độc.

- Giai đoạn này đà điểu cần phải đáp ứng đủ đạm, các loại vitamin và chất xơ để đảm bảo tốt cho sự phát triển. Đà điểu là loài động vật ăn cỏ nên không thể thay thế hoàn toàn bằng thức ăn tinh.



Hình 2. Rau muống được ngâm thuốc tím trước khi cho đà điểu ăn tránh bị ngộ độc

### 2.2. Cách thức cho ăn:

- Chuẩn bị thức ăn cho đà điểu:

- Rau muống sau khi được hái, mua về cần phải được ngâm qua thuốc tím sau đó rửa sạch lại bằng nước cho sạch cặn thuốc tránh gây hại thận.
- Cỏ voi sau khi cắt về cần loại bỏ hết phần già cứng, lá khô.
- Trộn rau, cỏ sau khi đã băm nhỏ với thức ăn tinh cho đà điểu ăn.

- Ở giai đoạn này ta có thể cho đà điểu ăn làm 3 cử sáng trưa và chiều



Hình 3. Chuẩn bị xay rau muống, cỏ cho đà điểu ăn

### 2.3. Máng ăn và máng nước :

- Để tiết kiệm chi phí bà có thể dùng máng gỗ hoặc vỏ bánh xe làm máng ăn.
- Sử dụng bồn cao su cắt ngang để làm máng uống nước cho đà điểu, đảm bảo đủ nước cho đà điểu uống cả ngày.
- Mỗi ngày cần phải vệ sinh máng nước một lần, đảm bảo nước sạch tránh ánh nắng trực tiếp chiếu vào.



Hình 4. Máng ăn cho đà điểu



Hình 5. Máng nước cho đà điểu

### III. Định lượng thức ăn cho đà điểu :

#### 3.1. Trong giai đoạn từ 3 tháng tuổi đến 5 tháng tuổi

- Nên phối trộn các loại nguyên liệu lại với nhau để đảm bảo chế độ dinh dưỡng tốt nhất cho đà điểu. Trước khi phối trộn, các loại cỏ trồng, rau xanh cần được băm nhỏ, hạt ngũ cốc đem nghiền nhuyễn, bổ sung thêm thức ăn tinh cùng với vitamin, premix khoáng, chế phẩm sinh học, ...

Tháng tuổi	Khối lượng (kg/con)	Thức ăn tinh (g/con/ngày)	Thức ăn xanh (g/con/ngày)
3	~22	0.8	0.8
4	~36	0.9	0.8
5	~47	1.0	1.2

### 3.2. Trong giai đoạn từ 5 tháng tuổi đến xuất chuồng

- Trong giai đoạn này, hệ sinh vật ở mạnh tràng đã phát triển hoàn thiện. Nếu có đủ nguồn nguyên liệu thức ăn xanh thì đà điều trên 5 tháng tuổi có thể tăng khẩu phần thức ăn xanh, giảm khẩu phần thức ăn tinh.

- Theo kinh nghiệm của trại, một ngày con trên 5 tháng có thể cho ăn được 2 kg cỏ, giảm khẩu phần thức ăn tinh chỉ còn khoảng 700g. Được chia làm 3 cử ăn, mỗi cử cho cỏ vào máng trước, sau đó mới phủ một lớp thức ăn tinh lên để kích thích đà điều thèm ăn. Áp dụng phương pháp này có thể giảm tối đa chi phí thức ăn trong chăn nuôi đà điều thương phẩm nhưng vẫn đảm bảo tăng trọng, lượng thịt vẫn đạt yêu cầu khi xuất chuồng

## IV. Các kỹ năng cơ bản:

### 4.1. Cách bắt và cố định đà điều :

- Khi vào chuồng bắt đà điều cần phải đi nhẹ nhàng ,có cây chống đỡ để đề phòng khi đà điều tấn công

- Đối với đà điều nhỏ thì tuyệt đối không được nắm vào cổ bắt buộc phải dùng tay luôn xuống phần bụng và nâng lên.

- Đối với đà điều trưởng thành khi bắt phải cần đến 3-4 người:

- Ta có thể dùng móc sắt choàng vào cổ và ấn xuống 2 người giữ 2 bên cánh 1 người giữ phần đuôi (**Lưu ý: khi dùng móc sắt dễ gây chấn thương cho đà điều khi đà điều giãy**)
- Đối với trường hợp không có móc sắt ta vẫn có thể bắt đà điều bằng cách 3-4 người dồn đà điều vào trong góc chuồng 1 người dùng tay nắm phần ngay cổ tiếp giáp với đầu và ấn xuống 2 người còn lại giữ 2 bên cánh và 1 người giữ phần đuôi và nhất nhẹ đuôi lên. (**Lưu ý: khi đà điều giãy mạnh ta cần nương theo chứ không nên cố giữ lại tránh gây gãy cổ đà điều**).



Hình 6. Cách bắt đà điểu

#### 4.2. Cách tiêm đà điểu:

- Có 2 vị trí ta có thể tiêm cho đà điểu:

- Tiêm dưới da : vị trí tiêm dưới da nằm ở phần da cổ cách thân đà điểu khoảng 1 gang tay, đâm kim 1 góc 45° sao cho kim tiêm vừa qua da thì ta tiến hành bơm thuốc.
- Tiêm bắp: vị trí tiêm bắp nằm ở phần nách phía trong cánh sát với thân đà điểu tiêm sâu vào trong bắp thịt đà điểu, đâm kim khoảng 90° .

#### - Lưu ý:

- + Khi tiêm cho đà điểu động tác tiêm phải dứt khoát.
- + Khi tiêm xong cần dùng tay xoa ngay vị trí tiêm cho thuốc tan nhanh, hạn chế tình trạng bị áp-xe



Hình 7. Vị trí tiêm bắp cho đà điểu



#### 4.3. Cách cho đà điều uống thuốc:

- Chuẩn bị pha thuốc vào chai có cổ dài.
- Sau khi đã cố định đà điều, ta tiến hành cho đà điều uống thuốc bằng cách dùng tay mở miệng đà điều một người cầm mỏ trên đà điều và một người cầm mỏ dưới mở ra và đổ thuốc đã pha vào thực quản đà điều tránh đổ vào khí quản làm ngạt thở. Đồng thời kéo cao cổ đà điều lên để cho thuốc chảy vào. Xong ta thả đà điều ra để đà điều tự nuốt vào.



### V. Các bệnh thường gặp trên đà điều trong giai đoạn này:

#### 5.1. Táo Bón:

##### a. Nguyên nhân:

- + Do con vật ăn quá nhiều cát
- + Ăn cỏ quá già, không uống đủ nước
- + Do nhu động của ruột kém

##### b. Triệu chứng:

- + Đà điều ủ ru, hay nằm, bỏ ăn, đứng không vững
- + Đi phân dê vón cục đi mỗi lần 1 ít
- + Hậu môn đỏ

##### c. Điều trị:

- + Cho đà điều ăn thêm rau muống non
- + Cho đà điều uống Sorbitol B12 + men tiêu hoá cho uống liên tục 3 ngày
- + Dùng thuốc thụt hậu môn ở thuốc tây bơm vào hậu môn cho đà điều.
- + Bỏ sung thêm gluco K-C cho đà điều
- + Đà điều khỏi bệnh ta cho uống thêm Ampicillin để diệt khuẩn đường tiêu hoá

##### d. Phòng bệnh:

- + Không cho đà điều ăn cỏ quá già
- + Đảm bảo đủ lượng nước cho đà điều



Hình 8. Thuốc điều trị táo bón

- + Định kì pha Sorbitol vào nước cho đà điều uống tuần 2 lần
- + Thường xuyên quan sát đà điều, phân để phát hiện bệnh kịp thời.

### 5.2. Khó tiêu

#### a. Nguyên nhân:

- + Do ăn thức ăn quá già, khó tiêu
- + Dạ dày co bóp kém không nghiền được thức ăn
- + Axit dạ dày tiết ra ít

#### b. Triệu chứng:

- + Đà điều bỏ ăn, ủ rũ, đứng tách đàn
- + Hay nằm, ít đi lại, xù lông

#### c. Điều trị:

- + Cho đà điều uống men tiêu hoá Super-Biotic (Uống 3 ngày liên tục)
- + Cho đà điều uống gluco K-C
- + Sau khi khỏi bệnh bổ sung cho đà điều Beconplex.

#### d. Phòng bệnh:

- + Cho đà điều ăn rau cỏ non
- + Định kì bổ sung men cho đà điều tuần 1 – 2 lần.

### 5.3. Tiêu chảy trên đà điều

#### a. Nguyên nhân:

- + Do vi khuẩn Ecoli, Samonella...
- + Do thức ăn, chuồng trại không đảm bảo vệ sinh
- + Sức đề kháng đà điều giảm.
- + Do thay đổi thời tiết nhất là vào mùa mưa.

#### b. Triệu chứng:

- + Đà điều bỏ ăn, ăn ít, ăn giả (mổ nhưng không nuốt thức ăn)
- + Đi phân lỏng có màu xanh hoặc vàng
- + Dáng đi xiêu vẹo, hay nằm
- + Có thể bị sốt niêm mạc miệng khô

#### c. Điều trị:

- + Sử dụng kháng sinh Ampicoli + men Super-Biotic
- + Bổ sung thêm điện giải Gluco K-C



Hình 9. Các loại kháng sinh đặc trị tiêu chảy

+ Sau khi khỏi bệnh bổ sung B-complex

**d. Phòng bệnh:**

- + Rau,cỏ cho ăn cần phải được rửa sạch.
- + Trộn phòng kháng sinh Ampicoli
- + Định kỳ vệ sinh, xịt sát trùng chuồng trại

**5.4. Bệnh viêm ruột hoại tử do Costridium**

**a. Nguyên nhân:**

- + Do vi khuẩn Costridium
- + Thay đổi khẩu phần ăn đột ngột, cho ăn với khẩu phần ăn có đậm quá cao.
- + Đà điều ăn phải con dòi.

**b. Triệu chứng:**

- + Phân có màu đen đặc trưng
- +Cổ dịch viêm trong mũi, miệng, khí quản, khó thở kết hợp với tiêu chảy.
- +Đà điều yếu chân,liệt chân,liệt cổ

**c. Bệnh tích:**

- + Xuất huyết tim, đường tiêu hoá.
- + Niêm mạc ruột bị tróc
- + Dạ dày tuyến căng phồng, dạ dày cơ thắt, ruột tắt nghẽn và bị trương phồng.

**d. Điều trị:**

- + Điều trị bằng kháng sinh Noxflorxacín, Apicilin, Penicillin
- + Bổ sung men Supper Biotic.
- + Tăng cường sức đề kháng bằng Bcomplex, Vitamin C, Elecamín.
- + Giải độc gan thận.

**5.5. Bệnh Nhiễm Trùng Đường Hô Hấp:**

**a. Nguyên nhân:**

- +Do thay đổi thời tiết lạnh, thời tiết nắng nóng
- +Các loại vi khuẩn virus như:Staphylococcus,Streaptococcus.



Hình 10. Kháng sinh điều trị Clostridium



Hình 11. Thuốc điều trị đường hô hấp

## TRUNG TÂM TƯ VẤN KỸ THUẬT 096.177.6664 CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ TÂN KỲ

- + Mật độ nuôi quá nhiều, chuồng nuôi thiếu độ thông thoáng.
- + Chuồng nuôi không được vệ sinh sạch sẽ, khí Amoniac nhiều.

### b. Triệu chứng:

- Đà điều bỏ ăn, ủ rũ, đứng tách đàn
- Thở khò khè, khó thở, thở gấp (do có dịch ở khí quản)
- Có thể sốt, bỏ ăn

### c. Điều Trị:

- Dùng kháng sinh để điều trị bệnh như: Gentamycin, Tylosin, Florphenicol,....
- Kết hợp dùng Bromhexin để đạt hiệu quả điều trị cao.
- Bổ sung thêm vitamin C + đường gluco để trợ sức cho đà điều

### d. Phòng bệnh:

- Vệ sinh chuồng, dụng cụ chăn nuôi sạch sẽ
- Định kì phun sát trùng chuồng trại
- Định kì phòng bệnh bằng kháng Gentamycin
- Định kì sử dụng tinh dầu bạc hà (Menthol mono) pha nước cho uống.



Hình 12. Thuốc hỗ trợ hô hấp

## 5.6. Bệnh Newcastle:

### a. Nguyên nhân:

- + Do virus thuộc họ Paramyxoviridae gây ra

### b. Triệu chứng:

- Triệu chứng điển hình là thần kinh(xoắn cổ, đứng một chỗ, đi xiêu vẹo)
- Sốt cao 42°C, da ửng đỏ
- Bỏ ăn, khó thở
- Có khi bị tiêu chảy phân xanh ,rất tanh, khắm.

### c. Bệnh tích:

- Viêm xuất huyết đường tiêu hóa, có những điểm loét hình nón ngược
- Dạ dày tuyến xuất huyết
- Xuất huyết dưới da

### d. Điều Trị:

- Không có thuốc đặc trị
- Tăng sức đề kháng bằng thuốc Becomplex, VitaminC...



Hình 13. Kháng thể Newcastle, Gumboro, IB, Cúm gia cầm

- Phòng kể phát các bệnh khác bằng các loại kháng sinh phổ rộng
- Khi phát hiện bệnh cần dùng kháng thể sau đó sử dụng vaccin

**e. Phòng bệnh:**

- Vệ sinh sát trùng chuồng trại sạch sẽ
- Sử dụng vaccin để phòng bệnh
- Tăng sức đề kháng cho vật nuôi

**5.7. Tắc nghẽn đường tiêu hoá:**

**a. Nguyên nhân:**

- + Do ăn phải dị vật như (Túi ni long, mảnh vải, đá sỏi to...).
- + Do viêm ruột mãn tính làm một số đoạn ruột thắt lại.
- + Ăn thức ăn khó tiêu.

**b. Triệu chứng:**

- + Ủ rú, đứng tách đàn, bỏ ăn, cơ thể gầy yếu.
- + Bài tiết thải không ra phân mà chỉ ra chất dịch keo đặc màu vàng
- + Bụng tóp lại
- + Sức khỏe giảm con vật nằm liệt một chỗ không ăn uống kiệt sức mà chết

**c. Bệnh tích:**

- + Đà điều gây ốm, teo cơ
- + Dạ dày tuyến chứa dị vật lẫn rau, cỏ, thức ăn.
- + Ruột rỗng không chứa thức ăn.

**d. Điều trị:**

- + Hiệu quả điều trị không cao.
- + Có thể cho đà điều uống dầu thực vật
- + Nếu dị vật nhỏ có thể dùng men tiêu hoá để bào mòn dị vật.

**e. Phòng bệnh:**

- + Thường xuyên kiểm tra, quét dọn chuồng trại sạch sẽ.
- + Nhặt các dị vật (túi ni long, đá to, lá cây...) ra khỏi chuồng nuôi.

**5.8. Bệnh xoắn ruột:**

**a. Nguyên nhân:**

- + Do thức ăn xanh thô quá già, khó tiêu.
- + Do đà điều chạy nhiều té ngã, chuyển chuồng đà điều.

**b. Triệu chứng:**

- + Bỏ ăn, ăn giả, đứng tách đàn.
- + Phản xạ thải phân nhiều lần nhưng chỉ ra dịch màu vàng.

+ Bụng căng, da chuyển màu xanh.

**c. Bệnh tích:**

+ Đoạn ruột bị xoắn lại không có máu lưu thông gây sung huyết và ứ máu

+ Phía sau đoạn bị xoắn ruột chuyển sang màu trắng đục

+ Xoang bụng tích nước màu nâu đen

**d. Điều trị:**

+ Khi xác định được bệnh, cần loại thải do không có khả năng cứu chữa

**e. Phòng bệnh:**

+ Không sử dụng các loại thức ăn xanh quá già, không thay đổi thức ăn đột ngột.

+ Loại bỏ các tác nhân gây hoảng loạn cho đà điểu.

+ Loại bỏ các chương ngại vật gây té ngã.

**5.9. Bệnh thiếu canxi, khoáng**

**a. Nguyên nhân:**

+ Do khẩu phần ăn không đủ chất

+ Do thiếu nắng làm cho đà điểu không tổng hợp canxi tự nhiên.

**b. Triệu chứng:**

+ Chân đứng không vững, rung chân

+ Hay nằm, khi nằm rồi đứng lên có biểu hiện rung chân

+ Đi loạng choạng, xiêu vẹo.

**c. Điều trị:**

+ Tiêm Canximax hoặc cho uống Canxi sủi của người.

+ Bổ sung thêm vitamin ADE, B-complex

+ Cho đà điểu phơi nắng sáng

**5.10. Bệnh viêm khớp**

**a. Nguyên nhân:**

+ Do vi khuẩn Ecoli, Pseudomonas, Proteus... gây ra.

+ Do chấn thương ở khớp chân.

**b. Triệu chứng:**

+ Khớp chân sưng to

+ Đau chân, đi cà nhắc, đi lại khó khăn



Hình 14. Canxi bổ sung cho đà điểu

**c. Điều trị:**

- + Tiêm kháng viêm cho đà điều như Dexa, Ketovet, Anagin C...
- + Dùng kháng sinh Amoxicillin.
- + Dùng thêm thuốc trợ sức trợ lực cho đà điều như Cafein, Bcomplex...



Hình 15. Thuốc điều trị viêm khớp cho đà điều

## VI. PHÒNG BỆNH TRÊN ĐÀ ĐIỀU TRONG GIAI ĐOẠN TỪ 90 NGÀY – 1 NĂM TUỔI

- Vệ sinh chuồng nuôi sạch sẽ tuần vệ sinh 1 lần.
- Định kỳ phun sát trùng chuồng trại tuần 1 lần.
- Kiểm tra loại bỏ dị vật thường xuyên
- Đảm bảo khẩu phần ăn đầy đủ dinh dưỡng cho đà điều
- Tăng sức đề kháng cho đà điều
- Tiêm ngừa vaccin đầy đủ cho đà điều.

### Lịch sử dụng thuốc theo từng giai đoạn cho đà điều

Tháng tuổi	Phòng bệnh	Phương pháp	Mục đích
3 – 5	- Becomplex (2g/kg TĂ, Tuần 3 lần)	Trộn thức ăn	-Kích thích thèm ăn, mau lớn
	- ADE (1g/kg TĂ, tuần 2 lần)	Trộn thức ăn	-Tăng trọng, Tăng đề kháng
	- Canxi và khoáng (10g/2kg TĂ, 2 tuần 1 lần)	Trộn thức ăn	- BỔ sung canxi và khoáng

	-Ampicolli (2g/kg TĂ,2 tuần 1 lần, trộn liên tục 2 ngày)	Trộn thức ăn	- Ngừa bệnh đường tiêu hoá
	- Gentatylo (2g/kg TĂ, 2 tuần 1 lần, trộn liên tục 2 ngày)	Trộn thức ăn	- Ngừa bệnh đường hô hấp
	- Electrolyte (5g/2L nước, ngày 1 lần lúc nắng nóng.	Pha nước uống	- Ngừa mất nước, chống stress.
	- Gluco K-C (ngày 1 lần, lúc nắng nóng)	Pha nước uống	- Giải độc, chống stress
	- Anti flu (3g/kg TĂ, dùng khi tiêm vaccin)	Trộn thức ăn	- Tăng sức đề kháng
	- Menthol mono (1ml/1L nước, tuần 1 lần)	Pha nước uống	- Hỗ trợ hô hấp
	- Elecamin (2ml/kg TĂ, tuần 1 lần)	Trộn thức ăn	- Bổ sung Vitamin, tăng hấp thu.
	- Men tiêu hoá (2g/kg TĂ, tuần 2 lần)	Trộn thức ăn	- Tăng cường hệ vi sinh, giúp tiêu hoá TĂ
	- Myco AD (2g/kg TĂ, tháng 1 lần)	Trộn thức ăn	- Hấp thu độc tố nấm mốc
<b>6 – 9</b>	- 6 tháng ngừa thêm bệnh H5N1	Tiêm dưới da	- Ngừa bệnh cúm gia cầm (H5N1)
	- Lặp lại vaccin Newcastle	Tiêm dưới da	- Ngừa bệnh newcastle
	- Chủng ngừa vaccin ILT.	Tiêm dưới da	- Ngừa bệnh viêm thanh khí quản truyền nhiễm
<b>10 – 12</b>	- Lặp lại vaccin ILT mỗi 3 tháng	-Tiêm dưới da	- Ngừa bệnh viêm thanh khí quản truyền nhiễm
	- Lặp lại vaccin H5N1 mỗi 6 tháng	Tiêm vaccin	- Ngừa bệnh cúm gia cầm (H5N1)

## VII. ƯU VÀ NHƯỢC ĐIỂM KHI CHĂN NUÔI ĐÀ ĐIỀU

-Ưu điểm:

- Có thể tận dụng được nguồn thức ăn sẵn có.
- Mau lớn, ít bệnh tật khi đã tiêm đủ vaccin



**TRUNG TÂM TƯ VẤN KỸ THUẬT 096.177.6664**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ TÂN KỲ**

- Giá trị kinh tế cao
- Thời gian nuôi ngắn.

-Nhược điểm:

- Giá con giống cao
- Con non yếu