

QUY TRÌNH

PHÒNG BỆNH BẰNG VACCIN TRÊN ĐÀ ĐIỀU

TƯ VẤN KỸ THUẬT: 096.177.6664

WEBSITE: TRAIGIONGDADIEU.COM.VN



ĐỊA CHỈ: 312/2 Bình Cang, Bình Quới, Châu Thành, Long An

QUY TRÌNH PHÒNG BỆNH BẰNG VACCIN TRÊN ĐÀ ĐIỀU

Hiện nay ngành chăn nuôi phát triển nên tình hình dịch bệnh diễn ra phức tạp. Một số bệnh bắt nguồn từ virus không có kháng sinh điều trị nên chúng ta chỉ còn cách phòng bệnh bằng vaccin . Một số bệnh phòng bằng vaccin trên đà điều như: Newcatsle, Gumboro, Marek, ND-IB, ILT, H5N1...


Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu cho chúng ta quy trình phòng bệnh bằng vaccin cho đà điều trong từng lứa tuổi.

1

1. Vaccin là gì:


- Vaccin là những chế phẩm sinh học, chúng có chứa mầm bệnh đã được làm suy yếu hoặc chết (không có khả năng gây bệnh). Sau khi tiêm chế phẩm này vào cơ thể vật nuôi, chế phẩm này sẽ kích thích cơ thể vật nuôi tạo ra kháng thể đặc hiệu để chống lại các mầm bệnh. Để phát huy tốt công dụng, việc sử dụng vaccin đòi hỏi kỹ thuật và bảo quản vaccin đúng cách.
- Vaccin được chia làm 2 loại là: vaccin sống (nhược độc), Vaccin chết (vô hoạt)

2. Quy trình sử dụng Vaccin cho đà điều:

| Ngày tuổi | Tên vaccin | Phòng bệnh | Đường cấp thuốc, liều lượng | Lưu ý trước và sau tiêm | Hình ảnh minh họa vaccin |
|-----------|------------|----------------|-------------------------------|--|--|
| 1 | Marek | Ngừa liệt chân | Tiêm dưới da cổ, liều 1cc/con | Sau khi tiêm vaccin, cần bổ sung Vitamin C giúp đà điều tránh nóng |  |

| | | | | | |
|----|-------------|---|--------------------------|---|--|
| 3 | Gumboro | Ngừa virus Gumboro | Nhỏ mắt, liều 1 giọt/con | Trước khi nhỏ vaccin 1 ngày, cho đà điều uống anti Gum giúp tăng hiệu quả vaccin Gumboro |  |
| 9 | ND (lasota) | Ngừa bệnh Newcastle chủng Lasota | Nhỏ mắt, liều 1 giọt/con | Sau khi nhỏ vaccin, cần pha thêm Gluco K-C cho đà điều uống nhằm giảm stress, tăng sức đề kháng, tránh nóng cho đà điều |  |
| 14 | ND-IB | Ngừa bệnh Newcastle chủng M và ngừa bệnh viêm phế quản truyền nhiễm | Nhỏ mắt, liều 1 giọt/con | Sau khi tiêm vaccin, cần pha Gluco K-C cho đà điều |  |

| | | | | | |
|--------------|--|--|---|---|--|
| 21 | Kháng thể Newcastle, ILT, IB ,Gumboro H5N1 | Cung cấp thêm kháng thể để phòng bệnh Newcastle, ILT, IB ,Gumboro H5N1 | Tiêm dưới da cổ cho đà điểu, liều 1cc/con | |  |
| 90 | Vaccin ILT | Phòng ngừa bệnh viêm thanh khí quản truyền nhiễm | Nhỏ mắt cho đà điểu mỗi con 1 giọt | Sau khi nhỏ vaccin, cần pha gluco K-C cho đà điểu uống để chống nóng, chống táo bón |  |
| 6 tháng tuổi | Vaccin H5N1 | Phòng ngừa bệnh cúm gia cầm | Tiêm dưới da cổ cho đà điểu, liều 1,5cc/con | Sau khi tiêm vaccin, cần pha Vitamin C giúp tránh nóng, tránh gây táo bón cho đà điểu |  |

| | | | | | |
|----------|---|--|---|--|---|
| 12 tháng | Vaccin ND + IB + EDS đối với đà điểu sinh sản | Phòng ngừa bệnh Newcastle, viêm phế quản truyền nhiễm, EDS hội chứng giảm đẻ trên đà điểu sinh sản | Tiêm dưới da cổ cho đà điểu, liều 1,5cc/con | Sau khi tiêm vaccin cần pha Vitamin C giúp tránh nóng, tránh gây táo bón cho đà điểu |  |
|----------|---|--|---|--|---|

- Con giống đà điểu 1 tháng tuổi ở trại khi giao tới tay khách hàng thì đã tiêm đủ các loại vaccin như : Newcastle, Gumboro, viêm phế quản truyền nhiễm (IB), Marek, kháng thể. Nhằm tạo ra chất lượng con giống tốt nhất, khỏe mạnh khi đến tay khách hàng.

- Trong quá trình nuôi của khách hàng:

- Khi đà điểu được 3 tháng tuổi thì anh/chị tiến hành chủng ngừa Vaccin phòng bệnh viêm thanh khí quản truyền nhiễm (ILT). Định kỳ lặp lại mỗi 3 tháng.
- Khi đạt 6 tháng tuổi tiến hành tiêm vaccin cúm gia cầm (H5N1), định kỳ lặp lại mỗi 6 tháng.
- Khi đạt 12 tháng tuổi tiến hành tiêm ngừa vaccin ND+IB+EDS phòng bệnh Newcastle, viêm phế quản truyền nhiễm (IB), hội chứng giảm đẻ (EDS). Định kỳ lặp lại mỗi 6 tháng.

3. Kỹ thuật tiêm và nhỏ vaccin cho đà điểu

a. Kỹ thuật tiêm vaccin cho đà điểu

- Vị trí tiêm:

- Tiêm dưới da: tiêm dưới da cổ cách thân đà điểu khoảng 1 gang tay vì vị trí này có thịt nên dễ dẫn vaccin không gây áp xe.
- Tiêm bắp: tiêm bắp thịt ở phía trong nách cánh đà điểu.

- Kỹ thuật tiêm:

- Tiêm dưới da: Khi tiêm dưới da ta kéo phần da ngay vị trí tiêm lên sau đó ta tiến hành đâm kim vừa qua da thì bơm m vaccin vào, mũi kim 45°. Động tác tiêm dứt khoát. Sau khi tiêm ta dùng tay xoa đều ngay vị trí tiêm cho tan vaccin giúp cho đà điều không bị áp xe.



Tiêm dưới da cho đà điều

- Tiêm bắp thịt: Khi tiêm bắp ta xác định vị trí bắp thịt sau đó trước khi tiêm, ta tiến hành tiêm với mũi kim 1 góc 90° vào sâu trong bắp thịt và bơm vaccin. Động tác tiêm dứt khoát, sau khi tiêm ta tiến hành xoa đều ngay vị trí tiêm cho thuốc tan tránh gây áp xe.



Tiêm bắp cho đà điều

- Kỹ thuật nhỏ vaccin cho đà điểu: Khi nhỏ vaccin cho đà điểu ta tiến hành nhỏ ở mắt cho đà điểu. Khi nhỏ vaccin thì ta dùng 1 tay mở mắt đà điểu và tiến hành nhỏ vaccin vào mắt. Liều 1 – 2 giọt một mắt.

******Lưu ý khi sử dụng vaccin để phòng bệnh**

- Vaccin phải được bảo quản đúng cách. Lắc đều, nhẹ nhàng vaccin khi pha
- Vaccin cần phải được xả lạnh trước khi sử dụng
- Không sử dụng vaccin hết hạn sử dụng.
- Không dùng vaccin khi cơ thể đà điểu bị nhiễm bệnh, suy giảm miễn dịch.
- Đường cấp thuốc phải đúng, đủ liều lượng
- Sau khi tiêm vaccin cần theo dõi tiếp vật nuôi để kịp thời can thiệp nếu có trường hợp sốc xảy ra.
- Khi dùng chưa hết thì không được vớt lung tung tránh phát tán mầm bệnh, phải cho vaccin dư vào thuốc sát trùng ngâm cho chết hết mầm bệnh.

b. Cách bảo quản vaccin:

- Vaccin phải được bảo quản ở nhiệt độ từ 2 – 8°C trong ngăn mát tủ lạnh
- Không để dưới ánh nắng trực tiếp

Mọi chi tiết về con giống hoặc thắc mắc về kỹ thuật chăn nuôi, xin quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp:

Công ty cổ phần Hà Tân Kỳ cung cấp Đà điểu giống uy tín, chất lượng

Địa chỉ: 312/2 ấp Bình Cang, xã Bình Quới, huyện Châu Thành, tỉnh Long An

Hotline: 02723900971 - 0363336669

Website: <http://www.traigiongdadieu.com.vn>

Fanpage: <https://www.facebook.com/dadieuhatanky/>

Youtube: <https://www.youtube.com/@trangtraihatanky727>

Tiktok: www.tiktok.com/@traigiongdadieu.htk



Nhỏ vaccin cho đà điểu